



จดหมายข่าว...



นายธงชัย อินทร์ประเสริฐ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม

“วิสัยทัศน์”



@ ฉบับประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม

NONGKUM ORGANIZATION

อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๖๐

โทร. ๐๓๔-๖๗๘๒๔๔

“ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเศรษฐกิจ พืชความยากจน ตำบลน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม เลิศล้ำภูมิปัญญา ประชามีส่วนร่วม”

กิจกรรมที่ดำเนินการในช่วงที่ผ่านมา

กิจกรรมช่วงเช้า

ร่วมพิธีวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณหน้าว่าการอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี



กิจกรรมช่วงเย็น



โครงการจัดงานวันแม่

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ๑๒ สิงหาคมนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม



ประชุมสภาอบต.สมัยสามัญ สมัยที่ ๓

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑

ณ ห้องประชุมกัลยาณมิตร (ชั้น ๒)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม



เกร็ดความรู้

ไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ เอช๑ เอ็น๑
(Influenza A (H๑N๑)) เป็นโรคที่แพร่ติดต่อระหว่างคนสู่คน พบที่ประเทศเม็กซิโก และสหรัฐอเมริกา แล้วแพร่ไปยังอีกหลายประเทศ และล่าสุดพบระบาดในประเทศไทย กลุ่มช่วงอายุที่พบมากที่สุดคือ วัยเด็กเล็กและวัยอนุบาล

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A เกิดจากเชื้ออะไร
เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ เอช๑เอ็น๑ (A/H๑N๑) เป็นเชื้อตัวใหม่ที่ไม่เคยพบมาก่อน เกิดจากการผสมสารพันธุกรรมระหว่างเชื้อไข้หวัดใหญ่ของคน สุนัข และนก

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A ติดต่ออย่างไร
การแพร่ติดต่อจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง เกิดขึ้นได้ง่าย เกิดจากถูกผู้ป่วยไอจามรดโดยตรง หรือหายใจเอาฝอยละอองเสมหะ น้ำมูก น้ำลายในระยะ ๑ เมตร เนื่องจากเชื้อไวรัสอยู่ในเสมหะ น้ำมูก น้ำลาย แต่บางรายอาจได้รับเชื้อทางอ้อม ผ่านทางมือ หรือสิ่งของเครื่องใช้ที่ปนเปื้อนเชื้อ เช่น แก้วน้ำ ลูกบิดประตู โทรศัพท์ ผ้าเช็ดมือ เป็นต้น เชื้อจะเข้าสู่ร่างกายทางจมูก ตา ปาก ผู้ป่วยอาจเริ่มแพร่เชื้อได้ตั้งแต่ ๑ วันก่อนป่วย ช่วง ๓ วันแรกจะแพร่เชื้อได้มากที่สุด ระยะแพร่เชื้อมักไม่เกิน ๗ วัน

อาการเมื่อรับเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A
ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะเริ่มมีอาการหลังจากได้รับเชื้อไวรัส๑-๓ วัน น้อยรายที่นานถึง ๗ วัน อาการป่วยใกล้เคียงกันกับโรคไข้หวัดใหญ่ ที่เกิดขึ้นทั่วไป เช่น มีไข้ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ไอ เจ็บคอ อาจมีอาการเบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน หรือท้องเสียด้วย ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรง และหายป่วยภายใน ๕-๗ วัน แต่บางรายที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อแรง จะมีอาการหายใจเร็ว เหนื่อย ซึ่งอาจทำให้เสียชีวิตได้



แหล่งที่มา : <http://www.mamaexpert.com/posts/content-๒๖๙๑>

